

Marchew na przechowalnictwo

ZASIANIE



BBCH 0-8




BBCH 11-13



BBCH 13-19



BBCH 19-41



BBCH 41-49

przed zasianiem

OCHRONA

NEMATOCYD

1 Velum Prime 0,65l/ha /
+ Nematado 1kg/ha

HERBICYDY

Racer 250EC 0,8-1l/ha +
Bandur/Yanarox 0,8-1l/ha +
Hurricane Soil 0,15l/ha +
+ AzotoPower 0,1kg/ha +
+ FosfoPower 0,1kg/ha

2

Activus/Stomp Aqua
1l/ha + Krum 0,5l/ha
zabieg wykonać w fazie
1 liścia właściwego
na suche liście!

3

Bandur/Yanarox 0,2l/ha
+ Krum 0,25l/ha + Activus/
Stomp Aqua 0,2l/ha
zabiegi powtarzać
3x w odstępie 5-7 dni

FUNGICYDY

5

+ BAKTERIOSTATYKI
+ PRODUKT
MIKROBIOLOGICZNY

Azoksar/Azarius
0,8l/ha

Signum 33WG/
Bigalo 0,75kg/ha

Azoksar/Azarius
0,8l + Valor 0,5

+
Signum/Bigalo
0,75kg/ha +
Vlor 0,5l/ha +
BaktoTarcza W
0,5kg/ha

+
Luna Experience
0,75l/ha/Switch
WG 0,8kg/ha +
BaktoTarcza W
1kg/ha

+ MiedźExtra660 3l/ha + Siarka Pro 80WG 2kg/ha

Prokill 0,5l/ha + Siltac 0,1/100l wody max 3 razy w sezonie

Obserwacja komunikatów o wylotach Połyśnicy Marchwiarki i pułapek feromonowych

4 Beneria 0,75l/ha stosować 2x w sezonie wegetacyjnym

PROleaf AQUA 0,1l/100l wody

ODŻYWIENIE

Kompleksowa technologia
AVALON KORZENIOWE

Avalon
"Rozwój liści"
dawka 7kg/ha

Avalon
"Zakrywanie międzyrzędzi"
dawka 8kg/ha

Avalon
"Intensywny wzrost"
dawka 8kg/ha

Avalon
"Dorastanie korzeni"
dawka 7kg/ha

Standardowa technologia
odżywiania

ProHorti PK 3-5kg +
imPROver 0,6l/ha

PROleaf N 3-5l/ha + ProHortiPlus NPK
4kg/ha + imPROver 0,6l/ha

ProHorti Mikro AminoMg 4kg/ha +
ProHorti Plus K 4kg/ha + Ca IDHA 1KG/ha

Acti Bor Pro + 2-3 l/ha zalecane 2-3 zabiegi w sezonie

1 Kilka dni przed siewem najlepiej wymieszać z glebą.

2 Zabieg wykonać do 5 dni po siewie na wilgotną glebę. Zalecana dawka wody 400l/ha. Na około 2 dni przed wschodami wykonać zabieg Glifosatem Halvetic/Agrosar w dawce max 2 l/ha. **(Nie wykonywać zabiegu Glifosatem przed spodziewanymi opadami deszczu!)**

3 Bandur/Yanarox i Stomp Aqua/Activus możemy podnieść po 150ml/ha, przy glebach cięższych. Na glebach lekkich, piaszczystych sugerujemy niższe dawki.

4 Zabieg wykonać bez innych ŚOR wyłącznie z dodatkiem adiuwantu olejowego OIL Pro + dawka 0,25l/100l wody.

5 Zabiegi fungicydowe wykonujemy w odstępie 21 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Posiadamy również alternatywne programy ochrony stworzone pod konkretne chwasty i choroby, w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z doradcami firmy PROCAM

