


PROGRAM OCHRONY
Marchew
wczesna

ZASIANIE



przed zasianiem

BBCH 0-8

BBCH 11-13

BBCH 13-19

BBCH 19-41

BBCH 41-49

OCHRONA

NEMATOCYD

1 Velum Prime 0,65l/ha /
 + Nematado 1kg/ha

HERBICYDY

Racer 250EC 0,8-1l/ha +
 Bandur/Yanarox 0,8-1l/ha +
 Hurricane Soil 0,15l/ha +
 + AzotoPower 0,1kg/ha +
 + FosfoPower 0,1kg/ha

Activus/Stomp Aqua
 1l/ha + Krum 0,5l/ha
 zabieg wykonać w fazie
 1 liścia właściwego
 na suche liście!

Bandur/Yanarox 0,2l/ha
 + Krum 0,25l/ha + Activus/
 Stomp Aqua 0,2l/ha
 zabiegi powtarzać
 3x w odstępie 5-7 dni

FUNGICYDY

5

+ BAKTERIOSTATYKI
 + PRODUKT
 MIKROBIOLOGICZNY

Azoksar/Azarius
 0,8l/ha

+
 MiedzExtra660
 3l/ha + Siarka Pro
 80WG 2kg/ha

+
 Signum 33WG/
 Bigalo 0,75kg/ha +
 BaktoTarcza W
 0,5kg/ha

+
 Azoksar/Azarius
 0,8l + Valor 0,5l +
 BaktoTarcza W
 0,5kg/ha

INSEKTYCYDY

ADIWANT

Prokill 0,5l/ha + Siltac 0,1/100l wody max 3 razy w sezonie

Obserwacja komunikatów o wylotach Połyśnicy Marchwianki i pułapek feromonowych

4 Benevia 0,75l/ha stosować 2x w sezonie wegetacyjnym

PROleaf AQUA 0,1l/100l wody

ODŻYWIENIE

Kompleksowa technologia
 AVALON KORZENIOWE

Avalon
 "Rozwój liści"
 dawka 7kg/ha

Avalon
 "Zakrywanie międzyrzędzi"
 dawka 8kg/ha

Avalon
 "Intensywny wzrost"
 dawka 8kg/ha

Avalon
 "Dorastanie korzeni"
 dawka 7kg/ha

Standardowa technologia
 odżywiania

ProHorti PK 3-5kg +
 imPROver 0,6l/ha

PROleaf N 3-5l/ha + ProHortiPlus NPK
 4kg/ha + imPROver 0,6l/ha

ProHorti Mikro AminoMg 4kg/ha
 + ProHorti Plus K 4kg/ha

Acti Bor Pro + 2-3 l/ha zalecane 2-3 zabiegi w sezonie

1 Kilka dni przed siewem najlepiej wymieszać z glebą.

2 Zabieg wykonać do 5 dni po siewie na wilgotną glebę. Zalecana dawka wody 400l/ha. Na około 2 dni przed wschodami wykonać zabieg Glifosatem Halvetic/Agrosar w dawce max 2 l/ha. **(Nie wykonywać zabiegu Glifosatem przed spodziewanymi opadami deszczu!)**

3 Bandur/Yanarox i Stomp Aqua/Activus możemy podnieść po 150ml/ha, przy glebach cięższych. Na glebach lekkich, piaszczystych sugerujemy niższe dawki.

4 Zabieg wykonać bez innych ŚOR wyłączenie z dodatkiem adiuwantu olejowego OIL Pro + dawka 0,25l/100l wody.

5 Zabiegi fungicydowe wykonujemy w odstępie 21 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Posiadamy również alternatywne programy ochrony stworzone pod konkretne chwasty i choroby, w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z doradcami firmy PROCAM

